

---

# NOS RECOMMANDATIONS AVANT VOTRE MAQUILLAGE PERMANENT

Marseille.Aubagne

---

## Précautions préalables à une session de maquillage permanent

Afin d'assurer la longévité et faciliter la prise du pigment lors de la procédure nous avons quelques conseils à vous délivrer:

- Durant les 5 jours qui précède, il est fortement conseiller de ne pas prendre d'aspirine ou tout aliment fluidifiant le sang ( alcool, café , thé...). La Tisane sera votre meilleure alliée ;)
- Vous devez impérativement consulter le consentement éclairé disponible en téléchargement sur notre site internet et le cas échéant, demandez l'avis de votre médecin en cas de doute.
- Vous devez avoir + de 18 ans, ne pas être enceinte, ni allaitante pour pouvoir effectuer un maquillage permanent.

### Précautions en fonction des zones:

#### **Les yeux:**

Se faire prescrire Proteochoc\* ou de l'Extranase\* (à raison de 3 comprimés matin/midi/soir durant les 7 jours qui précèdent l'acte)

#### **Les sourcils:**

N'épilez pas vos sourcils, je le ferais pour vous.

48h avant la dermopigmentation vous pouvez effectuer un gommage doux afin d'éliminer les cellules mortes et libérer ainsi la pilosité naissante du sourcil.

#### **Les Lèvres:**

Afin de prévenir l'apparition de bouton de fièvre, il faut impérativement se faire prescrire un traitement anti-viral tel que par exemple :

- Zelitrex\* (a raison de 3 comprimés matin/midi/soir durant 3 jours qui précèdent la procédure)

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire prescrire de la crème anesthésiante EMLA 5%\* par votre médecin traitant. Mettre la crème 2 heures avant votre rendez-vous en couche épaisse et recouvrir d'un film transparent et étirable ( Cellofrais).

- Tous les produits sont donnés à titre indicatif. Vous les trouvez en pharmacie; vous devez toutefois vous faire confirmer par votre médecin traitant qu'il n'existe aucune contre indication avec votre état de santé. Dans tous les cas la SAS Studio Confidence décline toutes responsabilités si une réaction survenait à l'issue de l'un des traitements préconisés dans le présent feuillet de recommandations.

